


# Sterilizarea – planificare familiar pentru feline



**CATS PROTECTION**  
**GHID ESENȚIAL 6**



Organizația Cats Protection (Protecție pentru Pisici) consideră că sterilizarea pisicii înainte ca aceasta să poată avea pui este o îndatorire de bază a oricărui stăpân responsabil. Pisicile se înmulțesc foarte repede, numărul puilor crescând direct proporțional cu cantitatea de hrană și adăposturile disponibile. Fără sterilizare, populația de pisici din Regatul Unit ar putea ieși rapid de sub control. Vă rugăm să nu contribuiți la creșterea numărului de pisici nedorite, deja de ordinul miilor. Suprapopularea duce la creșterea numărului de boli infecțioase și de boli cauzate de stres, și a numărului de conflicte în rândul felinelor, afectând negativ bunăstarea pisicilor.

## Ce este sterilizarea?

Sterilizarea este o intervenție chirurgicală care face ca pisica femelă să nu mai poată rămâne gestantă, și ca pisica mascul – motanul – să nu mai poată lăsa femela gestantă.

- Pisica femelă este sterilizată – îi sunt îndepărtate
- ovarele și uterul.
- Pisica mascul este castrată – îi sunt îndepărtate testiculele.

Organizația Cats Protection recomandă, în general, ca puii de pisică să fie castrați **în jurul vârstei de patru luni sau chiar mai mici – o pisică poate fi însă sterilizată la orice vârstă.** Sterilizarea este cea mai bună metodă de rezolvare a gestațiilor nedorite, prin prevenirea acestora. Sterilizarea previne de asemenea unele cancere și boli infecțioase, reducând vagabondajul, luptele și marcarea teritoriului.

## Când este bine să se facă sterilizarea?

În mod tradițional, pisicile erau sterilizate începând de la vârsta de șase luni. Datele științifice actuale indică însă că nu există niciun fel de dezavantaje asociate sterilizării la o vârstă mai mică – de exemplu, începând de la 8 săptămâni. Întrucât puii de pisică pot atinge maturitatea sexuală și se pot înmulți încă de la patru luni, organizația Cats Protection recomandă, în general, ca sterilizarea să se facă în jurul vârstei de patru luni, sau chiar mai repede.

## De ce este necesară sterilizarea?

Sterilizarea prezintă multe avantaje din punctul de vedere al sănătății, contribuind totodată la reducerea numărului de pisici nedorite din Regatul Unit

### **Motanii necastrați:**

- prezintă mai multe șanse să fie răniți sau să contracteze o boală ca urmare a luptelor pentru împerechere, cu suferințele de rigoare și facturi pe măsură la medicul veterinar;
- se deplasează cu regularitate în cadrul unui teritoriu întins, de ordinul kilometrilor, în căutare de femele nesterilizate, riscând să fie victimele accidentelor rutiere sau să fie răniți, ceea ce înseamnă că dumneavoastră veți rămâne fără animal de companie;
- se vor folosi de urină urât mirositoare pentru a-și marca teritoriul și atrage femele;
- riscă să sufere de tumori testiculare;

- nu sunt mai buni la vânătoare decât pisicile sterilizate, deoarece vânătoria nu este un comportament sexual;
- pot prezenta niveluri ridicate de stres, respectiv frustrare, datorate inabilității de a-și găsi o pereche.

### **În schimb, motanii castrați:**

- sunt mai puțin tentați să se deplaseze pe distanțe mari, reducându-se astfel riscul accidentelor rutiere;
- sunt mai puțin tentați de luptele pentru împerechere, ceea ce reduce riscul de rănire sau de contractare a unor boli grave, cum ar fi cele cauzate de virusul imunodeficienței feline (FIV) sau de virusul leucemiei feline (FeLV);
- sunt mai puțin tentați să își marcheze teritoriul;
- nu pot dezvolta tumori testiculare;
- vor fi animale de companie mai agreabile, deoarece vor fi tentați să stea acasă.

### **Femelele nesterilizate:**

- rămân gestante frecvent încă de la vârsta de patru luni;
- adesea vor avea cuiburi de pui de trei ori pe an; aceasta contribuie la problema suprapopulării și la cheltuieli mai mari pentru stăpân, îndeosebi dacă se ivesc complicații în timpul gestației sau fătării;
- vor miorlai și se vor văita la fiecare trei săptămâni în sezonul de împerechere – din ianuarie până în august – pentru a-și găsi o pereche, până când rămân gestante;
- prezintă mult mai multe riscuri să contracteze boli răspândite prin contact sexual sau ca urmare a comportamentului de împerechere;
- riscă să contracteze cancer ovarian sau mamar, precum și să dezvolte piometru, o infecție serioasă a uterului;

### **În schimb, femelele sterilizate:**

- nu vor rămâne gestante, drept care stăpânii nu vor trebui să suporte cheltuielile asociate cuiburilor de pui;
- nu miorlăie și nu se vaită ca și pisicile nesterilizate (Nu vor deranja somnul stăpânului și al vecinilor acestuia!);
- prezintă mai puține riscuri să contracteze boli cum ar fi FIV și FeLV, răspândite prin mușcăături și prin comportamentul de împerechere;
- nu pot dezvolta cancer ovarian sau uterin. În plus, dacă sunt sterilizate din timp, se reduce foarte mult și riscul de dezvoltare a cancerului mamar.

### **Puii născuți ca urmare a unei gestații neplanificate:**

- riscă să sufere boli;
- costă mult sub raportul îngrijirii și asistenței veterinare – mult mai mult decât se poate recupera prin vânzarea acestora pe o piață deja suprasaturată;
- se pot trezi fără adăpost;
- pot priva o altă pisică – adultă sau pui – de un nou stăpân, întrucât nu există suficiente persoane dornice să adopte pisici.

Mulți stăpâni nu știu cu care dintre felinele venite „în vizită” s-a împerecheat pisica lor nesterilizată, drept care nu știu cu ce boli infecțioase, posibil cauzatoare de moarte, s-a ales aceasta. În plus, temperamentul motanului poate afecta comportamentul puilor născuți. Împerecherea cu un „străin” poate produce pui care nu sunt potriviți ca animale de companie.

# Operația

Pisica dumneavoastră va trebui să rămână la cabinetul veterinar timp de o zi. Întrucât operația se va face sub anestezie necesară, pisicii nu i se va da să mănânce în orele anterioare intervenției. Medicul veterinar vă va spune când să îi dați mâncare. Operația, atât pentru masculi cât și pentru femele, este foarte simplă. În general vă puteți duce și lua pisica de la cabinet în aceeași zi.

După operație, femelele vor avea o mică porțiune rasă în zona laterală a corpului sau în zona abdominală – blana va reveni la normal după câteva săptămâni. Tăietura va fi cusută cu fire care, dacă nu sunt dizolvabile, vor fi scoase de veterinar după circa 10 zile de la operație.

Pisicile sunt foarte viguroase și stoice – într-o măsură mult mai mare decât oamenii – și de obicei își revin foarte repede după operație. Medicul veterinar vă va spune cum să vă îngrijiți pisica în perioada de recuperare. Puii par să își revină mult mai repede decât pisicile adulte. După sterilizare, pisica dumneavoastră va avea nevoie de mai puțină mâncare deoarece organismul acesteia va avea mai puțin de lucru. Va trebui probabil să țineți sub observație greutatea pisicii și să reduceți cantitatea de mâncare dată pentru ca aceasta să nu se îngrașe prea mult. Veți economisi astfel și bani.

## Cât costă operația?

Costul operației diferă în funcție de unde locuiți. Costul mediu variază între 30 și 60 de lire sterline pentru un motan, și între 40 și 80 de lire sterline pentru o pisică. Medicul veterinar vă va emite o factură proforma înainte de operația propriu-zisă. Este bine să contactați mai multe cabinete veterinare și să vă interesați de preț. În anumite cazuri, organizația Cats Protection acordă ajutor financiar stăpânilor de pisici cu venituri mici. Pentru mai multe detalii, vizitați [www.cats.org.uk/neutering](http://www.cats.org.uk/neutering) sau telefonați la 03000 12 12 12.

## Cum să găsiți un veterinar pentru sterilizarea pisicii

Cu toate că majoritatea cabinetelor veterinare fac intervenții de sterilizare, unele dintre ele nu sterilizează de obicei animale înainte de vârsta de șase luni. Numărul acestora este însă în scădere datorită suportului oferit de diverse grupuri cum ar fi Asociația Medicilor Veterinari Britanici pentru Animale Mici (British Small Animal Veterinary Association – BSAVA). Pentru a găsi un cabinet veterinar care oferă operații de sterilizare la vârste mai mici în zona în care locuiți, vizitați site-ul Web al organizației Cats Protection la [www.cats.org.uk](http://www.cats.org.uk)

Sterilizarea la vârste mici se practică de mult timp în numeroase țări, inclusiv în Australia și SUA, siguranța și eficacitatea acesteia fiind bine documentată. Studiile nu au găsit nicio dovadă că aceasta ar avea efecte negative, pe termen lung, asupra dezvoltării sau comportamentului. Noile tehnici și medicamente au făcut ca preocupările anterioare legate de riscurile prezentate de operație să nu mai fie justificate; se consideră că puii tineri se refac mult mai repede după operație decât pisicile adulte.

# Informații care diseminează miturile legate de sterilizare

- Pisicile se pot împerechea începând de la numai patru luni.
- Puii de pisică pot fi sterilizați, în condiții de siguranță, înainte de a împlini vârsta de șase luni.
- Pisicile se vor împerechea cu ușurință cu frații, surorile și părinții lor.
- Pisicile nu beneficiază de faptul că sunt lăsate să intre în călduri sau să aibă un cuib de pui înainte de a fi sterilizate.
- Durata gestației la pisici este de numai nouă săptămâni, o femelă putând intra cu ușurință în călduri la numai șase săptămâni după ce a fătat.
- O pisică poate avea cu ușurință până la trei cuiburi pe an, fiecare a câte cinci sau șase pui. Organizația Cat Protection trebuie deci să găsească, în fiecare an, 18 stăpâni iubitori pentru puii unei singure pisici! Acest ritm de reproducere este foarte epuizant, putând fi dăunător pentru pisica mamă.
- În numai cinci ani, o femelă nesterilizată poate fi răspunzătoare pentru 20.000 de descendenți – pisicile nesterilizate se găsesc unele pe altele cu ușurință, puii neplanificați și nedoriți apărând extrem de frecvent.
- Pisicilor sterilizate nu le „lipsesc” organele sau posibilitățile de a se reproduce sau a crește pui – ele nu sunt ființe umane!
- Pisicile femelă pot fi sterilizate și atunci când sunt în călduri, sunt gestante sau în lactație – adresați-vă medicului veterinar.



Cu toate că majoritatea stăpânilor își sterilizează pisicile, din nefericire un număr de pisici cu stăpân sunt lăsate să se reproducă înainte de a fi sterilizate, contribuind la problema suprapopulării și suprasolicitând organizațiile caritabile care se ocupă de animale. Vă rugăm să nu amânați până când este prea târziu. Discutați cu medicul dumneavoastră veterinar și programați-vă pisica pentru sterilizare chiar astăzi. Sterilizarea va fi benefică pentru pisica dumneavoastră, este posibil să prevină suferința acesteia, și este cea mai importantă măsură pe care o puteți lua pentru a ajuta populația de pisici în general.

### **Învățați lucruri noi despre pisica dumneavoastră online!**

**Aruncați o privire instrumentului nostru interactiv pentru a înțelege mai bine originile pisicii și comportamentul acesteia în casa noastră.**

**<http://learnonline.cats.org.uk/content/ufo>**

## GHIDURI ESENȚIALE

- 1 Cum să vă îngrijiți pisica
- 2 Cum să primiți o nouă pisică în casă
- 3 Mutarea într-o nouă locuință
- 4 Alimentația și obezitatea
- 5 Cum să vă protejați pisica
- 6 Sterilizarea – planificare familială pentru feline
- 7 Când să vă luați rămas bun
- 8 Chip-ul electronic
- 9 Cum să înțelegeți comportamentul pisicii
- 10 Cum să controlați comportamentul pisicii
- 11 Locuințele cu mai multe pisici
- 12 Pisicile de curte și pisicile de apartament
- 13 Pisicile și legea
- 14 Pisicile și oamenii
- 15 Cum să vă îngrijiți pisica
- 16 Pisicile bătrâne
- 17 Pisicile sălbatice
- 18 Pisicile gestante, fătarea și îngrijirea puilor mici

## GHIDURI VETERINARE

- 1 Artrita
- 2 Bolile tractului urinar inferior felin
- 3 Diabetul
- 4 Mâncărimi ale pielii la pisici – boli de piele
- 5 Parvovirusul felin
- 6 Boala de rinichi sau renală
- 7 Pisicile cu dizabilități
- 8 Hipertensiunea
- 9 Virusul imunodeficienței feline (FIV) și virusul leucemiei feline (FeLV)
- 10 Coronavirusul felin (FCov) și peritonita infecțioasă felină (FIP)
- 11 Murmurul cardiac și boala cardiacă
- 12 Hipertiroidismul
- 13 Astmul felin
- 14 Dentiția și igiena orală
- 15 Purecii și alți paraziți
- 16 Gripa felină
- 17 Bolile infecțioase și vaccinarea
- 18 Afecțiuni digestive – vărsăturile și diareea
- 19 Dumneavoastră și medicul dumneavoastră veterinar
- 20 Pisicile și femeile gravide – toxoplasmoza



**Pentru mai multe informații despre organizația Cats Protection sau pentru a face o donație, vizitați [www.cats.org.uk](http://www.cats.org.uk) sau sunați linia noastră de asistență telefonică la 03000 12 12 12.**

Organizație caritabilă înmatriculată la numărul 203644 (Anglia și Țara Galilor) și SC037711 (Scoția)

SEPT-13 CODE: 84006